

## **CEVAC BROILER ND K**

**Vacuna inactivada hiper concentrada para la inmunización activa de las aves contra la enfermedad de Newcastle (ND)**

### **COMPOSICION**

	<b>CEVAC BROILER ND K</b>
Cepa	La Sota NDV
Inactivación	Inactivada en B.E.I* ,
Emulsión	en emulsión agua en aceite

\*Agente de inactivación B.E.I: Binary Etthylen imina, a diferencia de las formalinas, que actúan sobre la envoltura viral, el BEI actúa sobre la capacidad de replicación del ácido nucleico del virus , logrando una mejor inducción de la inmunidad.

### **INDICACIONES**

CEVAC® BROILER ND K está recomendada para la vacunación de pollos de carne o pollitas de postura al primer día o en los primeros 10 días de edad contra la enfermedad de Newcastle (ND). CEVAC® BROILER ND puede ser utilizada sola o con otras vacunas a virus vivo de ND.

### **ADMINISTRACION Y DOSIS**

CEVAC® BROILER ND K deberá de ser administrada por vía subcutánea (debajo de la piel del cuello) o por vía intramuscular (en pechugas o muslos) en una dosis de 0.1 ml por ave.

### **PRECAUCIONES GENERALES**

Una satisfactoria protección puede obtenerse solo en aves bien desarrolladas y saludables.

Siempre utilizar equipo estéril.

Mantener la vacuna a temperatura ambiente 15° a 25°C por 8 a 12 horas antes de utilizar. Agitar bien la botella antes y durante su utilización.

Verificar la exactitud de la jeringa para asegurarse que se este administrando la dosis correcta.

Una vez que la botella ha sido abierta, el contenido debe de ser utilizado en las 24 horas siguientes, después de esto deberá de ser desechado.

### **MODO DE CONSERVACION**

Mantener entre 2°C y 8°C, protegida de la luz. No debe de ser congelada.

### **PRESENTACIÓN**

Frascos de 5000 dosis

Producida por CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.1107 Budapest, HUNGRIA  
Para CEVA SANTE ANIMALE La Ballastiere-BP 126 -33501 LIBOURNE Cedex, FRANCIA  
Importado y Distribuido por CEVA SALUD ANIMAL S.A.C. José González 681 Miraflores Lima, PERU