

MAXIMUNE® 8

Vacuna contra la Enfermedad de Gumboro, cepas estándar y variantes, Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa tipo Mass, y Reovirus Aviar. Virus Inactivados

DESCRIPCIÓN	MAXIMUNE 8 es una vacuna en emulsión oleosa que contiene tres cepas del virus de la enfermedad de Gumboro (uno estándar y dos variantes antigénicas ambas producidas 100% en tejido bursal) y tres cepas del reovirus incluyendo la cepa S1133 (un patotipo causante de la tenosinovitis), la cepa 2408 (un patotipo causante de la mala absorción) y la cepa SS412 (un serotipo distinto del reovirus tipo S1133 y causante de la proventriculitis y mala absorción en pollos de engorde). MAXIMUNE 8 también contiene el virus de la Enfermedad de Newcastle y virus de la bronquitis infecciosa (cepas Mass. 41 y Mass. Holland). Todos los virus en MAXIMUNE 8 son aislados no clonados producidos en substratos de aves SPF.
INDICACIONES	<p>La vacuna está indicada para su uso en aves sanas como ayuda en la prevención contra las enfermedades causadas por el virus de la enfermedad de Gumboro (tipos estándar o variantes), reovirus aviar, virus de la enfermedad de Newcastle y virus de la bronquitis infecciosa serotipos Mass. La vacunación en reproductoras provee anticuerpos maternos a la progenie para la prevención de una infección temprana de la enfermedad de Gumboro, tenosinovitis (artritis viral) y síndrome de mala absorción que incluye tránsito rápido y proventriculitis.</p> <p>Para obtener resultados óptimos con MAXIMUNE 8 se requiere que las aves estén adecuadamente primovacunadas con vacunas vivas contra la enfermedad de Gumboro, contra la tenosinovitis, la enfermedad de Newcastle y contra la bronquitis infecciosa serotipo Mass, por lo menos cuatro semanas antes de la administración de la vacuna inactivada.</p>
ADMINISTRACIÓN	Vacunar a pollos de por lo menos 18 semanas de edad con 0.5 ml (1/2 cc) por ave. Aplicar la vacuna por vía subcutánea en la región posterior del cuello, entre la cabeza y el cuerpo, no muy cerca de la cabeza. No se debe aplicar en el músculo ni en las vértebras del cuello.
PRESENTACIÓN	1000 dosis (vial de 500 ml)
PRECAUCIONES	No aplicar la vacuna emulsionada dentro de un periodo de 42 días previos al sacrificio. Almacenar la vacuna entre 2 a 7 °C (35 a 45 °F). No congelar. Esta vacuna contiene un adyuvante oleoso. En caso de producirse una inyección accidental en una persona, solicitar ayuda médica inmediatamente debido a que puede ocasionar una reacción localizada severa.
CONTROL DE CALIDAD	Esta vacuna ha sido sometida a pruebas rígidas de potencia, inocuidad y pureza y reúne los requerimientos de Ceva Biomune y del USDA. Consulte las instrucciones y precauciones específicas en la etiqueta del producto.

